

ДИАРТРИН

Если установлен диагноз остеоартрита, пациента беспокоят в первую очередь боли в пораженном суставе. А при генерализованном остеоартрите в патологический процесс вовлекаются 3 и более суставных группы – например, коленные, тазобедренные суставы, мелкие суставы кистей рук, позвоночник. Доказано, что болевой синдром при этом заболевании часто связан с воспалительным процессом. Боль и воспаление необходимо лечить, так как эти процессы в суставе могут привести к катастрофическим последствиям. Наиболее важное клиническое значение имеет поражение именно тазобедренных и коленных суставов, являющееся основной причиной снижения качества жизни и инвалидизации пациентов. Для лечения болевого синдрома при остеоартрите назначаются нестероидные противовоспалительные препараты. Есть нестероидные противовоспалительные препараты быстрого действия (такие как диклофенак, ацеклофенак, кетопрофен), которые помогают быстро справиться с болью, но при длительном приеме обладают рядом побочных действий (влияние на желудочно-кишечный тракт, почки, артериальное давление, тромбообразование), поэтому эту группу препаратов желательно назначать в минимальных дозах максимально короткое время. Но есть инновационные противовоспалительные препараты, зарегистрированные как симптом-модифицирующее лекарственное средство (препараты диацереина – ДИАРТРИН), которые не обладают вышеперечисленными побочными эффектами (их можно принимать длительное время). Данные препараты необходимо начинать принимать одновременно с «быстрыми» нестероидными противовоспалительными препаратами, так как эффект диацереина (ДИАРТРИНА) развивается не сразу, а только через 2-4 недели после начала приема. И показанием к применению препарата ДИАРТРИН является остеоартроз коленных и тазобедренных суставов.



Торговое название: ДИАРТРИН

Международное непатентованное название (МНН): Диацереин.

Фармакологическое действие

Диацереин ингибирует (блокирует) синтез и активность медиаторов воспаления, которые играют важную роль в развитии воспаления и последующем разрушении хряща

при остеоартрозе. А при длительном применении диацереин стимулирует синтез протеогликанов хрящевого матрикса.

Препарат принимается по 1 капсуле (50 мг) 2 раза в день с утренним и вечерним приемом пищи, так как одновременный прием данного препарата с пищей увеличивает его биодоступность на 25%.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к диацереину, другим компонентам препарата или производным антрахинона;
- воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона);
- кишечная непроходимость;
- боль в животе неясного генеза;
- пациенты с заболеваниями печени (в т.ч. в анамнезе);
- тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин);
- дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция;
- беременность и период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет.

С осторожностью:

- Почечная недостаточность средней степени тяжести (КК 30-60 мл/мин);
- Синдром раздраженной толстой кишки;
- Пациенты 65 лет и старше.

Способ применения и дозы

Стандартный прием по 1 капсуле 2 раза в день (утром и вечером, после еды). Капсулы следует проглатывать целиком, не разжевывая, и запивать водой. Эффект от лечения следует ожидать через 2-4 недели. Поскольку у некоторых пациентов может развиваться жидкий стул или диарея, рекомендуется начинать прием с 1 капсулы (50 мг) 1 раз в день с вечерним приемом пищи первые 2-4 недели, затем возможен стандартный прием препарата.

ДИАРТРИН применяется непрерывно длительно или курсами продолжительностью не менее 4 месяцев. Длительность перерыва между курсами лечения устанавливает врач.

Побочное действие

Благодаря проведению множества клинических исследований, были выявлены неблагоприятные явления, которые иногда появляются при приеме диацереина. Совсем не обязательно, что они проявятся, но о такой возможности необходимо помнить:

- слабительный эффект;
- боли в животе, рвота, тошнота;
- аллергические реакции;
- реакция печени на препарат (в виде повышения печеночных ферментов);
- окрашивание мочи от желтого до коричневого цвета (что не имеет клинического значения и не требует отмены препарата или снижения его дозы).

В основном препарат переносится хорошо, а учитывая склонность к запорам у пожилых пациентов, слабительное действие препарата чаще расценивается больше как положительный эффект. Продолжительность лечения в зависимости от достигнутого результата может быть длительной. Необходимо контролировать показатели крови (АЛТ, АСТ, креатинин) и мочи перед началом лечения и каждые 3 месяца на фоне лечения.

Производитель

АО «АЛИУМ», Российская Федерация.

Московская обл., г.о. Серпухов, рп. Оболенск, тер. Квартал А, д. 2.

РАИН-25-032021