

Амбене® Био (Ambene® Bio)

В 2016 году на европейском конгрессе в Малаге было заявлено, что лечение остеоартроза суставов следует начинать с хондропротекторов, то есть препаратов, которые обладают минимальными побочными действиями при длительном приеме, и длительным последствием после отмены.

Результаты клинических исследований, выполненных в том числе в нашей стране, свидетельствуют о том, что при внутримышечном введении SYSADOA анальгетический эффект развивается быстрее (в среднем в течение 1–1,5 мес), чем при использовании таблетированных препаратов (к 8–12-й неделе лечения). Одним из внутримышечных препаратов, который успешно применяется в ревматологической практике является АМБЕНЕ® Био (Ambene® Bio), представляющий собой стандартизированный стерильный экстракт из мелкой морской рыбы. Экстракт содержит мукополисахариды (хондроитин сульфат), аминокислоты, пептиды, ионы натрия, калия, кальция, магния, железа, меди и цинка.



Механизм его действия заключается в подавлении продукции ряда провоспалительных медиаторов, в частности интерлейкина, матриксных металлопротеиназ, ингибировании ангиогенеза, ингибировании гиалуронидазы и восстановление баланса гиалуроновой кислоты в суставе. Все это приводит к активации восстановительных процессов в тканях (в частности, восстановление структуры хряща). Помимо этого, препарат обладает и антиоксидантным эффектом. Доказано, что эффект уменьшения выраженности боли, улучшение функции коленных суставов и качества жизни наступает на 20–21 день лечения. Вводить препарат можно ежедневно по 1 мл, а можно через день по 2 мл (более удобные схемы лечения повышают приверженность пациентов к лечению).

Показания к применению

Первичный и вторичный остеоартроз различной локализации (коксартроз, гонартроз, артроз мелких суставов); остеохондроз и спондилез. Применяется для внутримышечного и внутрисуставного введения. Внутримышечно по 1 мл в день, курс лечения составляет 20 инъекций (по 1 инъекции в день в течение 20 дней); или — по 2 мл через день, курс лечения составляет 10 инъекций (по 1 инъекции через день в течение 20 дней). При преимущественном поражении крупных суставов — по 1–2 мл в каждый сустав с интервалом 3–4 дня. Всего на курс 5–6 инъекций в каждый сустав.

Возможно сочетание внутрисуставного и внутримышечного метода введения. Курс лечения повторяют 1 раз в 6 месяцев.

Российский производитель обеспечивает наиболее низкие цены по сравнению с другими инъекционными хондропротекторами и регулярные поставки в аптеки, что на данный момент является очень актуальным.